

**GOPRIX**

Lambda Cyhalotrina
Insecticida / Concentrado emulsionable

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**% en Peso****INGREDIENTE ACTIVO**

Lambda cyhalotrina (R): (R)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropano carboxilato y (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil(1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropano carboxilato.
(Equivalente a 60 g de i.a. /L a 20°C) 6.53%

INGREDIENTES INERTES

Emulsificantes, diluyente, disolvente, impurezas y compuestos relacionados 93.47%

Total 100.00 %

GOPRIX es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro a base de lambda cyhalotrina. Sirve para eliminar insectos y larvas por contacto e ingestión.

Cultivo	Dosis		Recomendación
Jitomate (5) *	Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>)	0.4-0.5 L/ha	Realizar una aplicación al follaje, volumen de aplicación 370-470 L de agua/ha
Maíz	Gusanos cortadores (<i>Agrotis spp</i>)	100 cm ³ /ha	Aplicar antes o después de la emergencia del cultivo. En este ultimo caso cuando se observe presencia de la plaga o plantas cortadas (3 orugas para 100 plantas o el 3% de daño). Dado al hábito nocturno de las orugas cortadas se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o con ataques el año anterior, pueden aplicarse solo o en malezas con herbicidas pre-emergentes o post-emergentes
		125 cm ³ /ha	Aplicar antes de sembrar el cultivo. Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o previamente en lotes provenientes

			pasturas o ataques en año anterior. Puede aplicarse solo en mezclas con herbicidas presiembra incorporándolo superficialmente al suelo.
	Isoca de la espiga (<i>Heliothis zea</i>)	25 cm ³ /ha	Con sistema de monitoreo, aplicar al observarse deposición de huevos en los estigmas. Preventivamente realizar una aplicación al aparecer las barbas y continuar con aplicaciones en intervalos de 3 días hasta senescencia de estigmas.
	Oruga cogollera (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	175-250 cm ³ /ha	Aplicar en presencia de las primeras hojas raspadas. En caso de zona endémica, repetir las aplicaciones semanalmente con cultivos de menos de seis hojas, recurrir a la dosis inferior y emplear dosis más altas con cultivos de mayor tamaño.
Soya	Barrenador del brote (<i>Epinotia aporema</i>)	100 cm ³ /ha+ 600-750 cm ³ /ha Clorpirifos 48% EC	A partir de floración al observarse los primeros daños en flores y vainas. Utilizar la dosis más alta de clorpirifos cuando se observe un 20-30% de brotes atacados. Con ataques más leves utilizar la dosis menor.
	Oruga de las leguminosas (<i>Aticarsia gemmatilis</i>)	134 cm ³ /ha	Antes de la floración, cuando se observen 15 a 20 orugas de 1.5 cm por metro lineal de cultivo o más de 20% de daño foliar. Lograr buena penetración foliar.
		175 cm ³ /ha	Después de la floración, cuando se observen 15 a 20 orugas de 1,5 cm por metro lineal de cultivo o más del 20% de daño foliar. Lograr buena penetración foliar.
	Chinche Verde (<i>Nezara Viridula</i>)	85 cm ³ /ha +500 cm ³ /ha Endosulfan 35% EC 85 a 120 cm ³ /ha +500 cc/ha Endosulfan 35% EC	Al comienzo de floración (tratamiento preventivo) o cuando se observen hasta 2 chinches por metro lineal de cultivo. Dosis para cultivos abiertos o de escaso follaje. Las dosis mayores para cuando se observen más de 2 chinches por metro lineal de cultivo. Dosis para cultivo muy cerrado o abundante follaje. Lograr una buena penetración en todo el follaje del cultivo.
	Isoca medidora (<i>Rachiplusia un</i>)	75 a 95 cm ³ /ha	Cuando se observen de 15 a 20 orugas o isocas mayores de 1.5 cm por metro lineal de cultivo y más de 20% de daño foliar. Usar la dosis menor cuando las plantas son aun pequeñas.
	Oruga militar tardía (<i>Spodoptera</i>)		

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto, llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora. Destape el frasco con cuidado. Haga una premezcla con la cantidad del producto necesario y poca agua. Agite perfectamente y agregue dicha premezcla al tanque o depósito de la aspersora, complete con agua hasta su capacidad, agitando continuamente. Aplique inmediatamente

CONTRADICCIONES

No se aplique en horas de calor intenso, no aplicar con vientos superior a 8 km/h.

FIÓXIDAD

Este producto no es fitotóxico para el cultivo a las dosis aquí recomendadas

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

Distribuido por:

Técnica Agrícola Chiapas SA de CV

Central Poniente No 24

Tapachula, Chiapas 30700

www.tacsa.mx.