

RODATAC

Rodamina

COLORANTE PARA SEMILLAS

Ingrediente Activo:

RODAMINA (Violeta básico 10).....54.00%

Ingredientes Inertes:

Solventes.....44.00%

Adherente (polisacárido).....02.00%

Total...100.00 %

Contenido Neto: 950 mls

Lote

Fecha de elaboración:

Fecha de Caducidad: Tres años después de su elaboración.

Distribuido por:

Tecnica Agrícola Chiapas SA de CV

Central Poniente No. 24

Tapachula, Chiapas, c.p. 30700

PARTE IZQUIERDA

ALTO, LEA LA EIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUENDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS ROPA O FORRAJES”
- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.
- “LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑASE Y PONGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN.

En caso de Intoxicación retire a la persona del area de contaminación, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, retire la ropa contaminada y pida ayuda al médico. Si ha habido contacto con la piel u ojos, lávese la parte afectada con abundante agua corriente limpia.

Recomendaciones al médico:

Síntomas de Intoxicación: Puede presentarse irritación en partes sensible como piel y ojos.

Tratamiento: Este producto no tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE.

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS.”

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, SU REGLAMENTO O PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO POR SEMARNAT.”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”

EN CASO DE DERRAMES SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MINERAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE

HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSO
AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN
EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARA LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

GARANTÍA: Como la aplicación, manejo y almacenaje de este producto están fuera de nuestro control, la empresa no se hace responsable del uso del mismo. TACSA solo garantiza la composición correcta y el contenido neto.

PARTE DERECHA

RODITAC es una colorante usando en al agricultura para la identificación se semillas tratadas con plaguicidas con el fin de prevenir daños por plagas durante el almacenaje, siembra o comercialización, la identificación de semillas tratadas permite al usuario extremar precauciones en el manejo de dicho material y evitar en gran medida las intoxicaciones por consumo de especies tratadas. Dentro de las semillas que se pueden tratar son: Maiz, Trigo, Avena, Sorgo, Soya, Acelga, Chicharo, Rábano, Betabel, Lechuga y papa.

En ganadería es usado para identificar animales que han sido manejados de forma especial o con condiciones de salud distintas a las del resto.

En banano es usado para identificar las áreas tratadas con ciertos agroquímicos en los que la homogénea aplicación juega un factor de suma importancia.

En huertas frutales es utilizado para identificar las areas que han sido tratadas con ciertos productos plaguicidas y fertilizantes con la finalidad de evitar controles deficientes por malas aplicaciones.

METODOS PARA APLICAR RODATINT:

Las dosis de aplicación puede variar dependiendo de la especie a tratar o en el caso de áreas a identificar. Para el caso de tratamiento de semillas de pre-siembra es importante usar la cantidad necesaria para que el color identifique comparativamente con las semillas no tratadas. Es importante asegurarse que el equipo de mezclado trabaje uniformemente para lograr un color homogéneo.

COMPATIBILIDAD:

RODITAC es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas del mercado. Úsese exclusivamente en las combinaciones de productos recomendados para el tratamiento de semillas.